

boso). Japan:—Kiushu: Prov. Osumi: Miyanoura (Yakushima) (Oct. 13, 1949, S. Katsuki): Formosa:—Prov. Taihoku: Shikikun (July 26, 1934, Y. Hashioka); Rumoan (July 30, 1934, Y. Hashioka).

The present species is new to Japan and Formosa.

25. **Puccinia Polygoni-amphibii** Persoon, Syn. Meth. Fung. 227 (1801).

Hab. II, (III). On *Fagopyrum vulgare* Hill var. *autumnale* Nemoto (*F. esculentum* var. *autumnale* Mak.) (Soba) (cult.). Japan:—Kiushu: Prov. Hiuga: Miyazaki-shi (Oct. 23, 1936, S. Hirata). *Fagopyrum vulgare* var. *autumnale* is a new host plant for this fungus.

26. **Uredo Laporteeae** Hiratsuka f., nov. spec.

Soris hypophyllis, laxe aggregatis vel sparsis, rotundatis vel ellipsoideis, minutissimis, 0.08~0.2 mm diam., mox nudis, pallide brunneis; paraphysibus numerosis, capitatis vel clavato-capitatis, saepe curvatis vel irregularibus, dilute flavo-brunneis, 32~60 μ longis ad apicem 12~25 μ latis et membrana incrassata (3~5 μ) praeditis cinctis; sporis subglobosis, ovatis vel ellipsoideis, densiuscule echinulatis, pallide flavo-brunneolis, 24~33 \times 15~25 μ ; episporio 1~1.5 μ crasso.

Hab. II. On *Laportea bulbifera* Wedd. (*Mukago-irakusa*). Japan:—Honshu: Prov. Echizen: Eiheiiji (Sept. 24, 1939, Hiratsuka, f. & E. Tobinaga, *type*!), Prov. Inaba: Mt. Hyonosen (Aug. 29, 1930, Hiratsuka, f.).

This fungus seems to be a species of *Phakopsora*, but it is proposed to classify it provisionally under the above name until its teleutospores are found.

○東亞植物圖説の最新號 Latest issue of Dr. Nakai's Iconographia Pl. Asiae Orient. by Shunyōdo Shoten, Tokyo.

Vol. 5 No. 2 (March, 1952) が出た。第148~155 圖版でヒトヨシテンナンショウ、シホカゼザクラ、オホアヲカモメヅル、ウナツギギボウシ、オホクルマバツクバネ等を圖解。近頃の代表的な植物畫家、加納川、安達、二口、太田の諸氏が筆を競つている。英國の畫家 Blunt 氏が The Art of Botanical Illustration (1950) という植物の畫の變遷史を書いた中に、近代の日本での植物畫の代表として本書を擧げていることゝ思ひ合せると興味がある。東京春陽堂の發行、定價 250 円 (前川文夫)